



<b>Inhoud</b>	
<a href="#">Algemeen</a>	
<a href="#">Anatomie bot</a>	
<a href="#">Groei</a>	
<a href="#">Operatie</a>	
<b>Algemeen</b>	
ligament test	0-2 mm 3-5 mm >5 mm
kraakbeen	Zie <a href="#">Ortho artritis en arthrose</a>
prothese	Na prothese pijn = infectielab afnemen
artritis vs arteritis	
bandcorrecties	met pees van: patellapees, gracilis, m plantaris longus
botcyste	bij gewricht tgv kb letsel, meestal is er verbinding
Condyl	Femur distaal
contusio	kneuzing
distorio	band oprekking
femurkop	Femur proximaal
ilizarov	Fixateur externe die helemaal rond het lidmaat gaat <b>Ind</b> pseudoarthrose, verlengings osteotomie
pilon	Tibia distaal, =enkel kom
spasticiteit	Zie <a href="#">Orthopedie pediatrie</a>
Sudeck atrofie	Zie <a href="#">Syndromen</a>
<b>Anatomie bot</b>	
Diafyse	
Apofyse	<b>Definitie</b> groeischijf
Epifyse	
<b>Groei</b>	
menarche	<b>Theorie</b> vroeger gold dat 6 mnd voor de menarche dat groeispurt het grootst was en dat 2 jr na de menarche de groei stopte, deze relatie is niet zo sterk, voor zekerheid beter botleeftijd bepalen met foto's
Botleeftijd	<u>Risserstadium</u>
<b>Operatie</b>	
verband	<b>Post-op</b> open de dag erna, hechtingen 2 wk ter plaatse, ijs opleggen, na 3 dg wondco
post-op	<ul style="list-style-type: none"><li>•dalfalgan-codeïne 1 doos, 1-4/dg</li><li>•kine: anti-inflam, mobilisatie</li><li>•clexane indien stilzitten, 40 mg SC na 3 dg (ivm wond) voor 3 wk</li></ul>
HK aan been	altijd AB
AS	=arthroscopie
litteken	nog rood dan nog inflamm binnen in
VOS	<b>definitie</b> verwijderen osteosynthese materiaal
cheilectomie	<b>definitie</b> osteofyten wegnemen