



<b>inhoud</b>	
<a href="#">Algemeen</a>	<a href="#">index</a>
<a href="#">Huid</a>	
<a href="#">Pees</a>	
<a href="#">Amputatie</a>	
<b>Algemeen</b>	
transplantatie	Cyclosporine = immunosuppressief
coagulatie	geen unipolaire coagulatie in vinger, beter charcot en afbinden bloedvaten
<b>Huid</b>	
crush letsel	<b>D/</b> pulsaties ?, capillary refill <b>R/</b> altijd met oplosbaar hechtmat (uithalen lukt nooit), geen AB = selectie eerst inflamm ↑ zalven tot granulatie ↑↑ dan CS tegen granulatie excess
gevoel vingers	vooral uln duim en rad index zeer belangrijk voor gevoel, hier schuifflappen gebruiken, geen huident
huident	moet na 10-14 pakken, daarna zal het niet meer gebeuren, conservatief verder, vanzelf necrose met auto-amputatie ent ontdoen van subcut vet ent bewaart eigenschappen donorplaats: haar, pigmentatie ent krimpt 1/3 en zal altijd pigmenteren FTG = full thickness graft
thenarflap	als huid ent (fascia en huid) voor vinger (vinger vast aan duimmuis), na 17-18 dg van elkaar, donorplaats moet vanzelf terug opgroeien
Lip verwonding	<b>Behandeling</b> niks aan doen tenzij de scheur door de 'whiteline' heen loopt in de huid, dan wel hechten, altijd vicryl gebruiken (oplosbaar)
verdooving	<b>Risico</b> IV → ritmestoornissen
Vetnecrose	<b>Definitie</b> necrose onderhuids vet <b>Oorzaak</b> contusio <b>Differentieel diagnose</b> fibrose <b>Behandeling</b> geen, corticosteroid injectie kan een toename van klachten en symptomen geven
vingertop letsel	<b>R/</b> 50% kan conservatief of 1 week elke dag verbandwissel door arts (vet gaas) of flammazine verband en paar dagen laten zitten
vingertop eraf	kan er bijna altijd terug op, bewaren op 4 <sup>o</sup> in vochtig compres in plastic zak met tweede zak met water en paar ijsklontjes in de koelkast
<b>Pees</b>	
Panaritium tendinium	<b>Definitie</b> panaritium (zie nagel) die naar de peesschede gaat, altijd palmair, dorsaal zijn er geen communicatieve schedes
spier hechten	2 spieren niet recht boven elkaar hechten, anders groeien ze aan elkaar hechten met prolene = niet oplosbaar
Pees hechten	<b>Post-op</b> volledige ruptuur: 6 weken gips partieele ruptuur: 4 weken gips
Flexorpees hand sectie	<b>Opp</b> = MCP flexie ↓ <b>diep</b> = flexie DIP ↓
<b>Amputatie</b>	
vervoer	In pencilline in water gaasje (100.000 E in 50 Ringerlactaat) in plastic zak in koffer met ijs