

Inhoud	
Bevalling Bevalling complicaties Borstvoeding	
Bevalling	
epidurale	vroeger risico op rotatie kind door mot block bekkenbodemspieren fluid load = ocytocine vrijzetting minder=arbeid 0,5-0,75 uur langer
Kraambedkoorts	placentarest infect → endometritis → PID
pH Kind	7,2
plaatsing	hoofd richting
Inwendige spildraai	Draai in de baarmoeder: hoofd gaat overdwars (vagina is overdwars het breedst)
Uitwendige spildraai	Draai met hoofd buiten de baarmoeder, schouders gaan overdwars (vagina is overdwars het breedst)
uitwendige bm ingang	1 vinger doorgankelijk, niet erg bij multigravida, curretage
Ligging	
Normaal	Hoofd naar beneden en achterhoofd naar voren
Stuitligging	Stuit naar beneden
Bevalling complicaties	
n peroneus compressie	in beensteunen
perineum scheur	gr III tot in anale sfincter
plexus ischiadicus schade	risico bij bevalling
Borstvoeding	
borststuwing	kan hoge koorts geven
borstvoeding mech	prolactine = melk productie, ocytocine = melk secretie
borstvoeding pro/con	Voordelen contact ↑ bescherming baby ↑, allergie ↓ afname gewicht moeder contraceptief ocytocine = bm kleiner ovarium/borst ca ↓ Nadelen tox. prod soms in borstvoeding atrofie vagina
borstvoedings problemen	tepelkoven stuwing (als baby slecht drinkt) mastitis (baby is verwekker)
Mastitis puerperalis	Behandeling • Flucloxacilline 500 mg 3dd1 PO, 7 dg bij pecilline allergie bv: • erytromycine 500 mg, 3dd1, 7 dg • clindamycine 300 mg 3dd1, 7 dg
mastitis	R/ Floxapen (50% SA) en drainage geïnfecteerde melk