



Inhoud	
Algemeen Huid	index
Algemeen	
Acuut gewrichtsreuma tetanus	Zie Infectie immunologie definitie wondklem incubatie 4-21 dg preventie tetanus immunoglobine tetanus toxoid (vaccin) → op een andere plaats injecteren, om 10 jaar herhalen tot 16 beschermt
bacterieel	1. echt ziek 2. piekende hoge koorts
Brucellose	komt van runderen+zuivelproducten, klieren en splenomegalie
Haemofylus influenza	Cefuroxime
Infernale trio	H. influenza, S. Pneumoniae, M. Catharalis
Kattekrabziekte	Bartonella, lymfeklieren
MRSA	= methicilline / multi resistente staph aureus, methicilline niet meer gebruikt nu oxacilline als test screening cultuur van neus R/ vancomycine IV zie AB
OPSI	Overwhelming postsplenectomy infection
parenchym koorts	hoge koorts, zonder rillen
re verschuiving WBC	lymfocyten en monocyt = viraal
rilkoorts	=acute hoge koorts alleen bij sepsis en "buisjes"koorts: cholangitis, pyelonefritis, pancreatitis
SA	Aumentin + Genramicine
Sepsis	1. plots begin 2. rilkoorts 3. WBC ↓, glycoside ↓ (eten bac) 4. vage abdom klachten/nausea/braken
Subfebril	<38
syfilitis	klieren en sjanker=plaque, pijnloos
Huid	
cellulitis	Volksmond "huid met putjes en onderliggend vet" Medisch subcutane ontsteking
furunkel	Definitie infectie (meestal streptokokken of SA) van de haarzakjes Symptomen lijkt op abces Behandeling laten rijpen (mooi rond, glanzende huid, fluctuatie) dan incisie en drainage (gaasje er half in om de opening op te houden) AB (zeker indien koorts): Floxapen (2 ^{de} keus erythromcine) conservatief mag ook
Lyme	Oorzaak spirocheet (=bacterie stam) Borrelia burgdorferi via tekenbeet (>24 uur teek vast, enkel als dicht bij struiken en geen kleren) Symptomen fase 1: erythema chronicum migrans (uitbreidende cirkel) fase 2: neurologisch, totaal AV Block, facialis parese, vermoeidheid, spierklachten fase 3: artritis Behandeling cefalosporine
impetigo	Kind stafylococcen (grote blaren), streptococcen (kleine blaren) Ouder subcorneale pustel, krentenbaard besmettelijk, niet erg ziek Behandeling • lokaal: mupirocine (Bactroban®) zalf 20 mg/g 2dd1 10 dg • PO: Flucloxacilline (Floxapen®) 500 mg 3dd1 milde infectie, 4 x 1000 bij ernstig 7 dg • PO: erythromycine 500 mg 3dd1, 10 dg • povidonjood zalf (10%) 2dd1
wondroos erysipelas	Zie erysipelas Definitie bacteriële infectie (meestal streptococcen) van de subcutis (vet) = wondroos Oorzaak Streptococcen in subcutis via wondje → lymfangitis Behandeling AB (floxapen) nat verband
tinea corporis	Zie Infectieziekten klinisch
tinea plantaris	bac tussen tenen, leven van keratine
abces	Behandeling laten rijpen dan incisie (ovaal vormig) + drainage (gaasje achterlaten, na 2 dag eruit) rijp als glanzend, gespannen, fluctuatie (indien twijfel dan punctie)
Atheroomcyste = sebuncyste	Definitie talgklier afgesloten → zwelling gevuld met talg infecteert vaak Symptomen zwelling thv behaarde huid infectie ? abces ? Behandeling niet geïnfecteerd → electief excisie hele haarzakje ge-infecteerd → incisie + drainage + als het mogelijk is haarzakje weghalen algeheel ziek → Augmentin 625 3dd1
Stinkende wond	definitie anaeroben behandeling flagyl
folliculitis	Definitie pustel in haarfollikel Oorzaak altijd SA Lokalisatie scalp, armen, benen



	Behandeling bactroban zalf 20 mg/g, 2dd1, 10 dagen erythomycine (macrolide) PO 500 mg 3dd1 10 dg	
gasgangreen	Clostridium perfringes, anaeroob, G+	
krentenbaard	Zie impetigo	