

Inhoud	
Insectenbeet Parasieten Protozoa Schimmel	index
Insectenbeet	
wespen/bijen gif	IgE → anafylaxie R/ H1 blokker, adrenaline
Strofylus	insectenbeet met langdurig effect
wespensteek	Risico 1) allergie 2) keel R/ systemisch: dexa + tavegil IV (evt vroege intubatie) lokaal: ammoniak
Bijensteek	Risico zie wespensteek R/ systemische: zie wespensteek lokaal: ammoniak
Parasieten	
scabies	parasiet, eerst exantheem, gangetjes onder de huid, buik en schouders, jeuk R/ zalvor
Toxoplasmose	Oorzaak Toxoplasma gondii van kattenfaeces, onvoldoende gekookt vlees Epidemiologie 15% bij vrouwen van 15-45 jaar Symptomen meestal asymptomatisch (60% besmet, meeste asymptomatisch) koorts, lymfeklieren, hepatosplenomegalie (lijkt op Pfeiffer) Risico zwanger Prognose goedaardig, zelf-limiterend
Protozoa	
Giardia	S/ diaree R/ flagyl
anti-worm	mebendazol (vermox®)
anti-malaria	chloroquine
anti-protozoa	metrozidazool (flagyl®) 500 mg 3dd1 IV (candida)
Schimmel	
Aspergillose	Zie Pneumologie infectie
gynodactarin®	Vaginale leptospirillen
Tinea Pedis	Zie Dermatologie
Tinea corporis "ringworm"	Oorzaak schimmel: Microsporium of Trichophyton Besmetting mens/dier, met name op natte iets beschadigde huid, vaak ook symptomeloos drager Incubatie 2-3 weken Symptomen traag uitbreidend, in plooiën, sint-catherine wiel (rode ring, bleek binnen)
	
	Behandeling

	miconazol (Daktarin®) 2% 2x/dg crème of strooipoeder (Ketoconazol 2% crème of sulconazol 1% kan ook)
Tinea capitis	Definitie is tinea corporis op het hoofd
Tinea pedis	Oorzaak schimmels: <ul style="list-style-type: none">• trichophyton rubrum• trichophyton mentagrophytes• epidermaphyton Floccusum Behandeling miconazole clotrimazole econazole
Tinea unguinum = onychomycose	Definitie kalknagel Oorzaak schimmels: <ul style="list-style-type: none">• trichophyton rubrum• trichophyton mentagrophytes Behandeling itraconazole P.O. 200 mg 1dd1 12 weken terbinafine P.O. 250 mg 1dd1 12 weken (bij beide middelen leverfunctie en RBC/WBC controleren)
Ringworm	Zie tinea corporis