



briden	direct (wkn) na operatie problemen, altijd dundarm obstructie R/ 72 uur maagsonde
closed loop obstructie	soms niet op RX AE te zien D/ echo
colon obstructie	type 1 Bauhin competent : hele colon dilatatie (meestal) type 2 Bauhin contractie : colon + dundarm dilatatie type 3 Bauhin incompetent : dundarm dilatatie zonder caecum dilatatie veel abdom opzetting (DD/ dundam)
ileus	definitie =geen transit, door obstructie/krampen/paralyse (mag wel krampen hebben) na 2 dagen obstructie (krampen) darmen uitgeput → paralytisch S/ geen stoelgang, braken D/ K ⁺ (gezien braken) R/ >10 cm = OK indicatie maagsonde, NPO, infuus
invaginatie	bloederige diaree, meestal ileocaecaal (Dance teken = leeg re fossa) event rectrectaal = interne prolaps
Ogilvee syndroom	spasticiteit colon descendens (obstructie) bij oud na HK R/ coloscopie
pseudo-obstructie	=paralytisch op medicatie of stress
radio-enteritis	na RT, event na 20 jaar, diaree
sequens	obstructie → strangulatie → peritonitis
strangulatie	peritonitis + obstructie = strangulatie=lumen+vasculaire obstructie prim of secund door darm distensie ac abdom→sympt↓→obstruct ileus→toxische shock
Rectum	
Marisca	Definitie = anal skin tag = uitstulpende huidplooi
Hirschprung	Zie Colon
anismus	persen + anale sfincter contractie ipv relaxtie (sex misbruik)
bloed in stoelgang	1. RBPA 1. op papier = fissuur 2. op/in faeces = ca, colitis 3. nadruppelen, WC = interne hemorroiden 2. Melena zie colon 3. occult
faecaal impactie	alleen in rectum D/ PPA
fistel	Pijnloos bij Crohn
fisuur	=mucosa scheur, pijnloos bij Crohn Behandeling lidocaine zalf 3% 30 min voor defaecatie isosobidedinitraat (ISDN) vaseline FNA 1% crème om de 3 uur
hemorroiden extern	Definitie onder huid, kunnen tromboseren (peri-anaale trombose), bloeden niet, trombose = erg pijnlijk Behandeling niet gethromboseerd sclerosering gethromboseerd incisie (ovaalvormig), uithalen thrombus en spoelen, open laten (lactulose mee), gaasje erin, 2x/dg spoelen
hemorroiden intern	Definitie interne hemorroiden (onder mucosa) →externe prolaps en bloeding, weinig pijn Behandeling repositie
obstipatie	Indeling 1. slow transit colon = <1x /2wk stoelgang (zie colon) 2. outlet obstructie = dyschezie
Peri-anaal abces	R/ wachten tot abces rijp is (rood, glanzend, fluctuatie)
rectale prolaps	Intern (recto-rectale invaginatie) of extern S/ obstipatie en incontinentie (gestoord sfincterreflex), slijm, ulcus
recto-rectoale invaginatie	veel persen op klein beetje harde stoelgang (restenarm) → interne prolaps → recto-rectale invaginatie → rectocoele, enterocoele D/ triple lumen RX
sigmoidvolvulus	waterige diaree, breed colon = predispositie, snavelbeeld R/ endoscopie